

## Goese Heggen Vogelinventarisatie 2006

### Inleiding

Dit rapport doet verslag van de in de winterperiode van 2005-2006 in de heggen aangetroffen vogels en gaat in op de aangetroffen broedvogels in 2006.

In 2006 zijn de vakken 17A en 17B in de Wilhelminapolder nauwkeurig geïnventariseerd conform de handleiding van Sovon. Dat wil zeggen dat het gebied in het voorjaar 5 maal is bezocht en iedere vogel op kaart is ingetekend. Op deze wijze is een goed inzicht gekregen welke broedvogels in deze fase van de ontwikkeling van de heggen aanwezig zijn. Het is de bedoeling deze heggen na een aantal jaren nogmaals nauwkeurig te inventariseren.

### Wintervogels.

Op 22 november, 23 januari en 22 februari werd het gebied bezocht. Opgemerkt moet worden dat, grenzend aan vak 4 (ten zuiden van de boerderij van Blok), een strook mais aanwezig was. Daarin bevonden zich veel vogels (Op 23-01-2006 130 kauwen, 60 vinkachtigen, 8 patrijzen) en dat heeft mogelijk invloed gehad op de in de singel aanwezige vogels.

De navolgende vogels werden aangetroffen:

22-11-2005

vak 2: 1merel

vak 4: 2 merels, 1 koperwiek, 1 winterkoning, 2 rietgorzen, 4 fazanten, 20 ringmussen

vak 13: 2 merels

vak 14: 1 roodborst, 1 koperwiek, 1 fazant

vak 17A: 6 putters, 15 koperwieken, 5 merels, 4 fazanten

vak 17B: 1 vink, 1 groenling, 3 putters, 4 koolmezen, 1 fazant, 9 koperwieken, 2 merels, 1 torenvalk, 1 rietgors

vak 17C: 25 graspiepers, 1 barmsijs, 2 merels

23-01-2006

vak 1: 1 waterhoen

vak 2: 1 merel, 1 roodborst, 3 groenlingen

vak 3: 6 koperwieken, 2 vinken

vak 4: 4 merels, 2 rietgorzen, 10 vinkachtigen, 10 ringmussen

vak 9: 1 zanglijster, 1 roodborst

vak 13: 2 merels

vak 14: 2 roodborsten, 2 zanglijsters, 3 merels, 2 rietgorzen

vak 17A: 1 gorsachtige

vak 17B: 1 roodborst, 2 koperwieken, 1 fazant

vak 17C: 5 merels, 1 roodborst, 2 zanglijsters

22-02-06

vak 17A: 1 merel

vak 17C: 2 merels, 1 grote lijster, 3 vinken

Lijsterachtigen maken dus graag gebruik van de singels in de winterperiode. Dat geldt ook voor vinkachtigen waarbij het voorkomen van een barmsijs aparte vermelding verdient. Ook de rietgors werd weer aangetroffen, zij het in kleine aantallen, waarbij het zo goed als ontbreken van de soort in de Wilhelminapolder op viel. In de voorgaande winter werden daar tientallen rietgorzen gezien. Ook de roodborst is dikwijls aanwezig en de dekking van de

singel bevat ook de fazant goed. De in vak 4 aangetroffen ringmussen hebben ongetwijfeld te maken met de op de boerderij voorkomende kippen.

In de aangrenzende waterloop langs vak 4 werd op 23-01 een kleine zilverreiger gezien, evenals 1 zwarte ruiter en 2 watersnippen. In de waterloop langs vak 17B zaten op de zelfde datum 40 smienten, 50 wilde eenden en 1 ijsvogel.

In tegenstelling tot het voorgaande seizoen werd slechts 1 maal een haas (bij vak 9) 'opgestoten'.

### Broedvogels

Zoals vermeld werden de vakken 17A en 17B dit jaar nauwkeurig onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De inventarisatie vond plaats op 25 maart, 15 april, 6 mei, 27 mei en 10 juni. Gestart wordt vroeg in de morgen omdat dan de vogels zingen. Op 10 juni dus al om 5 uur. Per 'wandeling' wordt ieder waargenomen vogel op een veldkaart 'ingetekend'. Na interpretatie van de kaarten kan vervolgens bepaald worden welke van de waargenomen vogels als broedvogels kunnen worden beschouwd. Zeker in april en mei trekken nog veel zangvogels door en dat kan het beeld 'vertroevelen'.

In vak 17A werd gebroed door 1 paartje bosrietzangers, 1 paartje grasmussen en een paartje winterkoningen.

In vak 17B ging het om 2 paartjes bosrietzanger en 1 paartje grasmussen.

Het voorkomen van de grasmus als broedvogel was te verwachten. Het is een broedvogel van struikgewas in doorgaans open terrein. De bosrietzanger is opmerkelijker. Bekend is dat de bosrietzanger in graanvelden broedt. Blijkbaar bood de ondergroei voldoende aantrekkingskracht om het ook in de singels te proberen. Verwacht mag worden dat bij het hoger worden van de singel deze soort weer zal verdwijnen.

Het winterkoninkje valt niet uit de toon.

En passant werden ook de vogels in het loofhoutbosje net ten noorden van de brug tussen vak 17A en 17B genoteerd. Zoals te verwachten was kwamen hier de voor deze biotoop kenmerkende soorten als zwartkop, tuinfluiter(2x), fitis, tjiftjaf, winterkoning, merel, zanglijster en houtduif voor.

De waterleiding met z'n oevers bood broedgelegenheid aan wilde eend (5x), kuifeend, waterhoen en meerkoet. In het aan de zuidzijde van vak 17A voorkomende rietveld broedde een paartje bruine kiekendieven.